

Biobeck PA 910

Pozwolenie Nr 0790/04

Preparat w postaci proszku do zwalczania ptaszyńca kurzego (*Dermanyssus gallinae*) w budynkach inwentarskich.

SUBSTANCJA CZYNNNA:

Pirogeniczny, syntetyczny i amorficzny, poddany obróbce powierzchniowej ditlenek krzemu w postaci nanocząsteczkowej – 100g/100g.

UŻYTKOWNIK POWSZECHNY

Zwalczanie ptaszyńca kurzego na powierzchniach w miejscach przebywania np. drobiu, gołębi i innych w małych hodowlach przydomowych, hobbystycznych, klatkach, wolierach.

ZASTOSOWANIE:

- Zabieg najlepiej przeprowadzić w godzinach rannych;
- Przed użyciem preparatu należy z klatek lub wolier usunąć obornik i inne zanieczyszczenia. Dokładnie sprzątnąć na sucho powierzchnie np. przy pomocy miotły.
UWAGA: Skuteczność zabiegu zależy od dokładności wstępnego oczyszczenia.
- Rozprowadzić Biobeck PA 910 równomiernie za pomocą aplikatora, w który wyposażona jest butelka lub łopatki itp.
- Strumień kierować głównie na miejsca przebywania ptaszyńca, jego kryjówki, miejsca spoczynku. Biobeck PA 910 powinien pokryć powierzchnie cienką warstwą. Nie należy stosować w obecności zwierząt.

DAWKOWANIE:

Zalecana ilość użytkowa na jeden zabieg wynosi 1 – 2 g w przeliczeniu na ptaka. Po pierwszym użyciu Biobecku PA 910, należy powtórzyć zabieg 6 – 8 razy w odstępach co 7 – 10 dni. Kolejne zabiegi zalecane są w przypadku ponownego porażenia roztocznymi jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA :

Dwutlenek krzemu jako składnik preparatu Biobeck PA 910 traktować jak każdy pył. Nie należy wdychać pyłu i nie kierować go bezpośrednio na siebie.

UŻYTKOWNIK PROFESJONALNY

Zwalczanie ptaszyńca kurzego na powierzchniach w miejscach przebywania np. drobiu, gołębi i innych w budynkach inwentarskich w chowie przemysłowym.

ZASTOSOWANIE:

- Zabieg najlepiej przeprowadzić w godzinach rannych;
- Przed użyciem preparatu należy z budynku inwentarskiego usunąć obornik i inne zanieczyszczenia. Dokładnie sprzątnąć na sucho powierzchnie klatek, podłogi, ściany, itp. (np. przy pomocy miotły, sprężonego powietrza lub odkurzacza przemysłowego). W trakcie czyszczenia należy wyłączyć wentylatory. UWAGA: Skuteczność zabiegu zależy od dokładności wstępnego oczyszczenia obiektu.

- Rozprowadzić Biobeck PA 910 równomiernie za pomocą odpowiedniego aparatu rozpylającego np. pistoletu ssąco-rozpylającego.
- Zabieg rozpoczynać w tylnej części budynku, przesuając się wzdłuż przejścia.
- Strumień kierować głównie na miejsca przebywania ptaszyńca, jego kryjówki, miejsca spoczynku. Biobeck PA 910 powinien pokryć cienką warstwą możliwie wszystkie powierzchnie. Nie należy stosować w obecności zwierząt.

DAWKOWANIE:

W przypadku intensywnej produkcji, zależnie od wyposażenia, rodzaju budynku i stopnia porażenia, zaleca się:

- ok. 10 kg Biobecku PA 910 w przeliczeniu na powierzchnię, którą zajmuje 10.000 ptaków,
- mniejsze ilości użytkowe można stosować w wentylowanych budynkach inwentarskich z transporterami taśmowymi do usuwania odchodów;
- w budynkach inwentarskich z urządzeniami do chowu podłogowego oraz przy chowie w wolierach ilość użytkowa na jeden zabieg wynosi 1 – 2 g w przeliczeniu na ptaka.

Po pierwszym użyciu Biobecku PA 910, należy powtórzyć zabieg 6 – 8 razy w odstępach co 7 – 10 dni. Kolejne zabiegi zalecane są w przypadku ponownego porażenia roztocami jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA :

Dla ochrony użytkownika profesjonalnego, który dokonuje zabiegów wielkopowierzchniowych, zaleca się przy rozprowadzaniu preparatu stosować filtr ochronny typu P1/P2 i standardowe ubranie ochronne oraz okulary ochronne.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Składować szczelnie zamknięty w suchym miejscu. Zabezpieczyć przed powstawaniem ładunków elektrostatycznych. W przypadku składowania dużych ilości, zapewnić wentylację magazynów.

PIERWSZA POMOC:

Wdychanie: Poszkodowane osoby wyprowadzić w razie potrzeby na świeże powietrze.

Kontakt ze skórą: Nie ma konieczności stosowania żadnych specjalnych zabiegów.

Kontakt z oczami: Wypłukać dokładnie oczy przy otwartych powiekach dużą ilością wody. W przypadku utrzymujących się dolegliwości – skonsultować się z okulistą. Połknięcie: Wypłukać jamę ustną wodą.

MOŻLIWE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE SKUTKI UBOCZNE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA PRODUKTU:

Po wdychaniu: kaszel, kichanie.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU I Z OPAKOWANIEM:

Produkt i jego opakowanie nie są odpadami niebezpiecznymi, można usuwać je łącznie z odpadami komunalnymi.

Podmiot odpowiedzialny:

Agro – Trade Sp. z o.o.

Gowarzewo, ul. Akacyjowa 3, 63-004 Tulce

Tel. 61 820 85 95. www.agro-trade.com.pl

Numer serii:


Data produkcji:

Trwałość : 3 lata od daty produkcji

Ilość produktu w opakowaniu:

2024 -10- 23

Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Biobójczych


Aleksandra Wilczyńska

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobków Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182, REGON:015249601

